



[Tecnica di Organizzazione Neurologica]

{Unità2: Da 1 a 8}

Ci sono alcune combinazioni di base che devono essere fatte prima di ogni altro stress. Ad esempio la condizione di switching (squilibrio informativo neurologico), oppure i punti di base per l'andatura in relazione ai centri visivi e vestibolari, la libertà dell'Atlante vista come sublussazione laterale o anteriore, eccetera.

1.2 Mobilità dell'atlante e lunghezza della gamba

2.0 Categoria II Fissazione Sacrale e Sublussazione di C3

2.2 Fissazione Occipitale

2.3 Torsione della Dura Madre

3.0 Switching Posteriore

4.0 Riflessi di Centratura della testa/Centratura pelvica Labirintica

5.0 Integrità del Medio Gluteo

6.0 Difetto Craniale Universale (Occipite Laterale/Atlante Anteriore)

7.0 Switching Anteriore

8.0 Riflesso di Correzione Oculare/Centralizzazione Pelvica Cloacale (ant./post.)

Ogni passaggio va fatto ad occhi aperti e occhi chiusi, se c'è stress in una o entrambe le posizioni oculari, fare la correzione mentre la persona mantiene gli occhi in quella posizione e muove gli occhi in tutte le direzioni.

Se c'è uno squilibrio sia a occhi aperti che chiusi la correzione va ripetuta in entrambi le modalità oculari.

Dopo una o due sedute fatte solo con occhi aperti e chiusi la seduta successiva può essere fatta "in relazione allo stress specifico".

Nei passaggi da 1 a 8 non serve attivare il banco di memoria attraverso gli occhi che sarà visto nel modulo Complesso Lesioni Craniali.

Costo 80 euro (75 € + Contr. Imp.) mediante bonifico o carta di credito online.